

Soil is future , future is safe with us

Kristal AG; It is an agricultural company where agricultural engineers and chemical engineers work together and has a product range in line with the needs of farmers and agriculture, and develops and expands this product range day by day.

We serve the agricultural sector with our wide dealer network in all regions of our country, experienced agricultural engineers and strong technical team.

خاک، سرچشمه فرداست و فردا در دستان امن ماست

کریستال AG فراتر از یک شرکت کشاورزی است؛ جایی که زمین، دانش را می‌خواند و ما پاسخش را می‌آوریم. مهندسان کشاورزی و شیمی ما با هم‌افزایی تخصص‌های خود، نیازهای واقعی خاک و کشاورز را درک کرده و راهکارهایی علمی، نوآورانه و کاربردی ارائه می‌کنند.

محصولات ما تنها ترکیبات فنی نیستند، بلکه نتیجه گفت‌وگویی مستمر میان انسان و طبیعت‌اند؛ گفت‌وگویی که هر روز گسترده‌تر، پخته‌تر و هدفمندتر می‌شود.

با تکیه بر شبکه گسترده نمایندگی‌ها، مهندسان باتجربه و تیم فنی توانمند، کریستال AG همراهی قابل‌اعتماد برای کشاورزان و فعالان صنعت کشاورزی است؛ پلی میان امروز و فردایی روشن، جایی که هر دانه فرصتی است برای شکوفایی، پیشرفت و ساختن آینده‌ای پایدار.

LUX :
لوکس

ترکیب تضمین شده (% وزنی/وزنی)

- ماده آلی: ۲۰٪
- نیتروژن کل: ۹٪
- نیتروژن آلی: ۱٪
- نیتروژن اوره‌ای: ۸٪
- اسید آلزینیک: ۰.۵٪
- اسید جیبرلیک: ۰.۰۸٪
- اسید هیومیک-فولویک: ۷٪
- اسید آمینه: ۵٪
- pH: ۴.۵ – ۶.۵

دوز مصرف پیشنهادی

- سبزیجات (با آبیاری قطره‌ای): ۱ – ۲ لیتر در هکتار
- سبزیجات (ماله‌پاشی برگه‌ای): ۲۰۰ – ۴۰۰ سی‌سی در هکتار در ۱۰۰ لیتر آب
- درختان میوه و محصولات زراعی (با آبیاری قطره‌ای): ۱ – ۲ لیتر در هکتار
- درختان میوه و محصولات زراعی (با آبیاری سطحی/غرقابی): ۱ – ۲ لیتر در هکتار
- درختان میوه و محصولات زراعی (ماله‌پاشی برگه‌ای): ۲۰۰ – ۵۰۰ سی‌سی در هکتار در ۱۰۰ لیتر آب

توصیه می‌شود مصرف کود پس از انجام آنالیز خاک و/یا برگ انجام شود.
مقادیر ذکر شده، میانگین نتایج آزمایش‌های انجام‌شده توسط شرکت ما است و ممکن است بر اساس ساختار خاک تغییر کند.
برای تعیین دقیق‌ترین دوز، با نمایندگی نزدیک یا شرکت ما تماس حاصل فرمایید.

X :

ایکس

ترکیب تضمین شده (% وزنی/وزنی)

- ماده آلی: ۵۷٪
- کربن آلی: ۲۳٪
- اکسید پتاسیم محلول در آب (%): ۵ (K₂O)
- اسیدهای آمینه آزاد: ۷٪

دوز مصرف پیشنهادی

- سبزیجات (با آبیاری قطره‌ای): ۱ – ۲ لیتر در هکتار
- سبزیجات (ماله‌پاشی برگه): ۲۰۰ – ۴۰۰ سی‌سی در هکتار در ۱۰۰ لیتر آب
- درختان میوه و محصولات زراعی (با آبیاری قطره‌ای): ۱ – ۲ لیتر در هکتار
- درختان میوه و محصولات زراعی (با آبیاری سطحی/غرقابی): ۱ – ۲ لیتر در هکتار
- درختان میوه و محصولات زراعی (ماله‌پاشی برگه): ۲۰۰ – ۵۰۰ سی‌سی در هکتار در ۱۰۰ لیتر آب

توصیه می‌شود مصرف کود پس از انجام آنالیز خاک و/یا برگ انجام شود.
مقادیر ذکر شده، میانگین نتایج آزمایش‌های انجام شده توسط شرکت ما است و ممکن است بر اساس ساختار خاک متفاوت باشد. برای تعیین دقیق‌ترین دوز مصرف، با نمایندگی نزدیک یا شرکت ما تماس حاصل فرمایید.

OCEAN PLUS

اوشین پلاس

ترکیب تضمین شده (% وزنی/وزنی)

- ماده آلی: ۱۵٪
- کربن آلی: ۱۱٪
- اکسید پتاسیم محلول در آب (%): ۲.۵ (K₂O)
- اسید آلزینیک: ۱.۵٪
- اسید جیبرلیک: ۰.۴٪
- pH: ۴ – ۶

دوز مصرف پیشنهادی

- سبزیجات (با آبیاری قطره‌ای): ۱ – ۲ لیتر در هکتار
- سبزیجات (ماله‌پاشی برگه‌ای): ۲۰۰ – ۴۰۰ سی‌سی در هکتار در ۱۰۰ لیتر آب
- درختان میوه و محصولات زراعی (با آبیاری قطره‌ای): ۱ – ۲ لیتر در هکتار
- درختان میوه و محصولات زراعی (با آبیاری سطحی/غرقابی): ۱ – ۲ لیتر در هکتار
- درختان میوه و محصولات زراعی (ماله‌پاشی برگه‌ای): ۲۰۰ – ۵۰۰ سی‌سی در هکتار در ۱۰۰ لیتر آب

توصیه می‌شود مصرف کود پس از انجام آنالیز خاک و/یا برگ انجام شود. مقادیر ذکر شده، میانگین نتایج آزمایش‌های انجام شده توسط شرکت ما است و ممکن است بر اساس ساختار خاک متفاوت باشد. برای تعیین دقیق‌ترین دوز مصرف، با نمایندگی نزدیک یا شرکت ما تماس حاصل فرمایید.

ترکیب تضمین شده (% وزنی/وزنی)

- ماده آلی: ۱۵٪
- کربن آلی: ۱۰٪
- نیتروژن کل (%): ۱ (N)
- اکسید پتاسیم محلول در آب (%): ۲ (K₂O)
- اسید آلزینیک: ۱٪
- اسید جیبرلیک: ۰.۴ ppm
- pH: ۴.۵ – ۶.۵

دوز مصرف پیشنهادی

- سبزیجات (با آبیاری قطره‌ای): ۱ – ۲ لیتر در هکتار
 - سبزیجات (ماله‌پاشی برگه‌ای): ۲۰۰ – ۴۰۰ سی‌سی در هکتار در ۱۰۰ لیتر آب
 - درختان میوه و محصولات زراعی (با آبیاری قطره‌ای): ۱ – ۲ لیتر در هکتار
 - درختان میوه و محصولات زراعی (با آبیاری سطحی/غرقابی): ۱ – ۲ لیتر در هکتار
 - درختان میوه و محصولات زراعی (ماله‌پاشی برگه‌ای): ۲۰۰ – ۵۰۰ سی‌سی در هکتار در ۱۰۰ لیتر آب
- توصیه می‌شود مصرف کود پس از آنالیز خاک و/یا برگ انجام شود.
- مقادیر ذکر شده، میانگین نتایج آزمایش‌های انجام شده توسط شرکت ما است و ممکن است بر اساس ساختار خاک متفاوت باشد. برای تعیین دقیق‌ترین دوز مصرف، با نمایندگی نزدیک یا شرکت ما تماس حاصل فرمایید.

ANIMUS

آنیموس

اسید آمینه منشا حیوانی

ترکیب تضمین شده (% وزنی/وزنی)

- ماده آلی: ۲۴%
- کرین آلی: ۱۲%
- نیتروژن آلی (%): ۲ (N)
- اکسید پتاسیم محلول در آب (%): ۱۵ (K₂O)
- اسیدهای آمینه آزاد: ۱۵%

دوز مصرف پیشنهادی

- سبزیجات (با آبیاری قطره‌ای): ۱ - ۲ لیتر در هکتار
- سبزیجات (ماله‌پاشی برگه‌ای): ۲۰۰ - ۴۰۰ سی‌سی در هکتار در ۱۰۰ لیتر آب
- درختان میوه و محصولات زراعی (با آبیاری قطره‌ای): ۱ - ۲ لیتر در هکتار
- درختان میوه و محصولات زراعی (با آبیاری سطحی/غرقابی): ۱ - ۲ لیتر در هکتار
- درختان میوه و محصولات زراعی (ماله‌پاشی برگه‌ای): ۲۰۰ - ۵۰۰ سی‌سی در هکتار در ۱۰۰ لیتر آب

توصیه می‌شود مصرف کود پس از آنالیز خاک و/یا برگ انجام شود.

مقادیر ذکر شده، میانگین نتایج آزمایش‌های انجام شده توسط شرکت ما است و ممکن است بر اساس ساختار خاک متفاوت باشد. برای تعیین دقیق‌ترین دوز مصرف، با نمایندگی نزدیک یا شرکت ما تماس حاصل فرمایید.

ODIN

اودین

اسید آمینه منشا حیوانی

ترکیب تضمین شده (% وزنی/وزنی)

- ماده آلی: ۱۶%
- کربن آلی: ۸%
- نیتروژن آلی (%۱.۵ N):
- اکسید پتاسیم محلول در آب (%۱۱ K₂O):
- اسیدهای آمینه آزاد: ۱۰%

دوز مصرف پیشنهادی

- سبزیجات (با آبیاری قطره‌ای): ۱ – ۲ لیتر در هکتار
 - سبزیجات (ماله‌پاشی برگه‌ای): ۲۰۰ – ۴۰۰ سی‌سی در هکتار در ۱۰۰ لیتر آب
 - درختان میوه و محصولات زراعی (با آبیاری قطره‌ای): ۱ – ۲ لیتر در هکتار
 - درختان میوه و محصولات زراعی (با آبیاری سطحی/غرقابی): ۱ – ۲ لیتر در هکتار
 - درختان میوه و محصولات زراعی (ماله‌پاشی برگه‌ای): ۲۰۰ – ۵۰۰ سی‌سی در هکتار در ۱۰۰ لیتر آب
- توصیه می‌شود مصرف کود پس از آنالیز خاک و/یا برگ انجام شود.
- مقادیر ذکر شده، میانگین نتایج آزمایش‌های انجام شده توسط شرکت ما است و ممکن است بر اساس ساختار خاک متفاوت باشد. برای تعیین دقیق‌ترین دوز مصرف، با نمایندگی نزدیک یا شرکت ما تماس حاصل فرمایید.

AMON

آمون

اسید آمینه با منشأ حیوانی

محتویات تضمین شده % (وزنی-وزنی)

ماده آلی: ۱۵

کربن آلی: ۷

نیتروژن آلی (۱): N)

اکسید پتاسیم محلول در آب (۷): K_2O)

اسیدهای آمینه آزاد: ۶

مقادیر مصرف:

- * در سبزیجات: ۱ تا ۲ لیتر در دکامتر (با سیستم آبیاری قطره‌ای)
- * در سبزیجات: ۲۰۰ تا ۴۰۰ سی‌سی در دکامتر در ۱۰۰ لیتر آب (با کاربرد برگ‌ی)
- * در درختان میوه و محصولات زراعی: ۱ تا ۲ لیتر در دکامتر (با سیستم آبیاری قطره‌ای)
- * در درختان میوه و محصولات زراعی: ۱ تا ۲ لیتر در دکامتر (با آبیاری غرقابی)
- * در درختان میوه و محصولات زراعی: ۲۰۰ تا ۵۰۰ سی‌سی در دکامتر در ۱۰۰ لیتر آب (با کاربرد برگ‌ی)

(توصیه می‌شود کوددهی پس از آنالیز خاک و/یا برگ انجام شود.)

مقادیر مصرف ذکر شده در اینجا میانگین مقادیر به‌دست‌آمده از آزمایش‌های انجام‌شده توسط شرکت ما است.

این مقادیر بسته به بافت خاک‌ها ممکن است متغیر باشد. برای دریافت بهترین برنامه مصرف، با فروشنده نزدیک خود یا شرکت ما تماس بگیرید.)

وی اف ایکس پرو

محتویات تضمین شده % (وزنی-وزنی)

ماده آلی: ۳۰

کربن آلی: ۱۱

نیتروژن آلی: ۲

اسیدهای آمینه آزاد: ۹

pH: ۵-۳

مقادیر مصرف:

- * در سبزیجات: ۱ تا ۲ لیتر در دکامتر (با سیستم آبیاری قطره‌ای)
- * در سبزیجات: ۲۰۰ تا ۴۰۰ سی‌سی در دکامتر در ۱۰۰ لیتر آب (با کاربرد برگ‌گی)
- * در درختان میوه و محصولات زراعی: ۱ تا ۲ لیتر در دکامتر (با سیستم آبیاری قطره‌ای)
- * در درختان میوه و محصولات زراعی: ۱ تا ۲ لیتر در دکامتر (با آبیاری غرقابی)
- * در درختان میوه و محصولات زراعی: ۲۰۰ تا ۵۰۰ سی‌سی در دکامتر در ۱۰۰ لیتر آب (با کاربرد برگ‌گی)

(توصیه می‌شود کوددهی پس از آنالیز خاک و/یا برگ انجام شود.)

مقادیر مصرف ذکر شده در اینجا میانگین مقادیر به‌دست‌آمده از آزمایش‌های انجام‌شده توسط شرکت ما است.

این مقادیر بسته به بافت خاک‌ها ممکن است متغیر باشد. برای دریافت بهترین برنامه مصرف، با فروشنده نزدیک خود یا شرکت ما تماس بگیرید.)

دیپ

محتویات تضمین شده % (وزنی-وزنی)

ماده آلی: ۳۰

کربن آلی: ۱۰

نیتروژن آلی (۱): N)

اکسید پتاسیم محلول در آب (۲): K_2O

اسیدهای آمینه آزاد: ۲

مقادیر مصرف:

- * در سبزیجات: ۱ تا ۲ لیتر در دکامتر (با سیستم آبیاری قطره‌ای)
- * در سبزیجات: ۲۰۰ تا ۴۰۰ سی‌سی در دکامتر در ۱۰۰ لیتر آب (با کاربرد برگ‌گی)
- * در درختان میوه و محصولات زراعی: ۱ تا ۲ لیتر در دکامتر (با سیستم آبیاری قطره‌ای)
- * در درختان میوه و محصولات زراعی: ۱ تا ۲ لیتر در دکامتر (با آبیاری غرقابی)
- * در درختان میوه و محصولات زراعی: ۲۰۰ تا ۵۰۰ سی‌سی در دکامتر در ۱۰۰ لیتر آب (با کاربرد برگ‌گی)

(توصیه می‌شود کوددهی پس از آنالیز خاک و/یا برگ انجام شود.

مقادیر مصرف ذکر شده در اینجا میانگین مقادیر به‌دست‌آمده از آزمایش‌های انجام‌شده توسط شرکت ما است.

این مقادیر بسته به بافت خاک‌ها ممکن است متغیر باشد. برای دریافت بهترین برنامه مصرف، با فروشنده نزدیک خود یا شرکت ما تماس بگیرید.

NOIR

نوییر

(تقویت کننده ریشه)

مقادیر مصرف:

- * در سبزیجات: ۱ تا ۲ لیتر در دکامتر (با سیستم آبیاری قطره‌ای)
- * در سبزیجات: ۲۰۰ تا ۴۰۰ سی‌سی در دکامتر در ۱۰۰ لیتر آب (با کاربرد برگ‌گی)
- * در درختان میوه و محصولات زراعی: ۱ تا ۲ لیتر در دکامتر (با سیستم آبیاری قطره‌ای)
- * در درختان میوه و محصولات زراعی: ۱ تا ۲ لیتر در دکامتر (با آبیاری غرقابی)
- * در درختان میوه و محصولات زراعی: ۲۰۰ تا ۵۰۰ سی‌سی در دکامتر در ۱۰۰ لیتر آب (با کاربرد برگ‌گی)

(توصیه می‌شود کوددهی پس از آنالیز خاک و/یا برگ انجام شود).

مقادیر مصرف ذکر شده در اینجا میانگین مقادیر به‌دست‌آمده از آزمایش‌های انجام‌شده توسط شرکت ما است.

این مقادیر بسته به بافت خاک‌ها ممکن است متغیر باشد. برای دریافت بهترین برنامه مصرف، با فروشنده نزدیک خود یا شرکت ما تماس بگیرید.

VITALIZING

ویتالایزینگ

محتویات تضمین شده % (وزنی-وزنی)

کل ماده آلی: ۳۵

کربن آلی: ۱۶

کل نیتروژن: ۲

اکسید پتاسیم محلول در آب (۲): K_2O

pH: ۶-۴

مقادیر مصرف:

- * در سبزیجات: ۱ تا ۲ لیتر در دکامتر (با سیستم آبیاری قطره‌ای)
- * در سبزیجات: ۲۰۰ تا ۴۰۰ سی‌سی در دکامتر در ۱۰۰ لیتر آب (با کاربرد برگ‌ی)
- * در درختان میوه و محصولات زراعی: ۱ تا ۲ لیتر در دکامتر (با سیستم آبیاری قطره‌ای)
- * در درختان میوه و محصولات زراعی: ۱ تا ۲ لیتر در دکامتر (با آبیاری غرقابی)
- * در درختان میوه و محصولات زراعی: ۲۰۰ تا ۵۰۰ سی‌سی در دکامتر در ۱۰۰ لیتر آب (با کاربرد برگ‌ی)

(توصیه می‌شود کوددهی پس از آنالیز خاک و/یا برگ انجام شود).

مقادیر مصرف ذکر شده در اینجا میانگین مقادیر به‌دست‌آمده از آزمایش‌های انجام‌شده توسط شرکت ما است.

این مقادیر بسته به بافت خاک‌ها ممکن است متغیر باشد. برای دریافت بهترین برنامه مصرف، با فروشنده نزدیک خود یا شرکت ما تماس بگیرید.

محتویات تضمین شده % (وزنی-وزنی)

ماده آلی: ۲۵

نیتروژن آلی: ۱

روی محلول در آب (۶): Zn

اسید آمینه: ۴

pH: ۵-۳

مقادیر مصرف:

- * در سبزیجات: ۱ تا ۲ لیتر در دکامتر (با سیستم آبیاری قطره‌ای)
- * در سبزیجات: ۲۰۰ تا ۴۰۰ سی‌سی در دکامتر در ۱۰۰ لیتر آب (با کاربرد برگ‌ی)
- * در درختان میوه و محصولات زراعی: ۱ تا ۲ لیتر در دکامتر (با سیستم آبیاری قطره‌ای)
- * در درختان میوه و محصولات زراعی: ۱ تا ۲ لیتر در دکامتر (با آبیاری غرقابی)
- * در درختان میوه و محصولات زراعی: ۲۰۰ تا ۵۰۰ سی‌سی در دکامتر در ۱۰۰ لیتر آب (با کاربرد برگ‌ی)

(توصیه می‌شود کوددهی پس از آنالیز خاک و/یا برگ انجام شود.

مقادیر مصرف ذکر شده در اینجا میانگین مقادیر به‌دست‌آمده از آزمایش‌های انجام‌شده توسط شرکت ما است.

این مقادیر بسته به بافت خاک‌ها ممکن است متغیر باشد. برای دریافت بهترین برنامه مصرف، با فروشنده نزدیک خود یا شرکت ما تماس بگیرید.)

لیون

محتویات تضمین شده % (وزنی-وزنی)

هیومیک + فولویک اسید با منشأ لئوناردیت:

ماده آلی: ۱۵

هیومیک اسید + فولویک اسید: ۱۵

pH: ۵-۳

مقادیر مصرف:

- * در سبزیجات: ۱ تا ۲ لیتر در دکامتر (با سیستم آبیاری قطره‌ای)
- * در سبزیجات: ۲۰۰ تا ۴۰۰ سی‌سی در دکامتر در ۱۰۰ لیتر آب (با کاربرد برگ‌گی)
- * در درختان میوه و محصولات زراعی: ۱ تا ۲ لیتر در دکامتر (با سیستم آبیاری قطره‌ای)
- * در درختان میوه و محصولات زراعی: ۱ تا ۲ لیتر در دکامتر (با آبیاری غرقابی)
- * در درختان میوه و محصولات زراعی: ۲۰۰ تا ۵۰۰ سی‌سی در دکامتر در ۱۰۰ لیتر آب (با کاربرد برگ‌گی)

(توصیه می‌شود کوددهی پس از آنالیز خاک و/یا برگ انجام شود).

مقادیر مصرف ذکر شده در اینجا میانگین مقادیر به‌دست‌آمده از آزمایش‌های انجام‌شده توسط شرکت ما است.

این مقادیر بسته به بافت خاک‌ها ممکن است متغیر باشد. برای دریافت بهترین برنامه مصرف، با فروشنده نزدیک خود یا شرکت ما تماس بگیرید.

ان سول

محتویات تضمین شده % (وزنی-وزنی)

کل نیتروژن: ۱۵

نیتروژن اوره: ۱۵

پنتا اکسید فسفر محلول در آب (۵): P_2O_5

بور محلول در آب (۰.۵): B)

کل تری اکسید گوگرد (۶۰): SO_3

مقادیر مصرف:

- * در سبزیجات: ۱ تا ۲ لیتر در دکامتر (با سیستم آبیاری قطره‌ای)
- * در سبزیجات: ۲۰۰ تا ۴۰۰ سی‌سی در دکامتر در ۱۰۰ لیتر آب (با کاربرد برگ‌گی)
- * در درختان میوه و محصولات زراعی: ۱ تا ۲ لیتر در دکامتر (با سیستم آبیاری قطره‌ای)
- * در درختان میوه و محصولات زراعی: ۱ تا ۲ لیتر در دکامتر (با آبیاری غرقابی)
- * در درختان میوه و محصولات زراعی: ۲۰۰ تا ۵۰۰ سی‌سی در دکامتر در ۱۰۰ لیتر آب (با کاربرد برگ‌گی)

(توصیه می‌شود کوددهی پس از آنالیز خاک و/یا برگ انجام شود.

مقادیر مصرف ذکر شده در اینجا میانگین مقادیر به‌دست‌آمده از آزمایش‌های انجام‌شده توسط شرکت ما است.

این مقادیر بسته به بافت خاک‌ها ممکن است متغیر باشد. برای دریافت بهترین برنامه مصرف، با فروشنده نزدیک خود یا شرکت ما تماس بگیرید.

SULFOLIN

سولفولین

کلونیدی و سوسپانسیون
گوگرد مایع
به صورت گوگرد عنصری (S) با خلوص ۹۸٪

مقادیر مصرف:

- * در سبزیجات: ۱ تا ۲ لیتر در دکامتر (با آبیاری قطره‌ای)
- * در سبزیجات: ۲۰۰ تا ۴۰۰ سی‌سی در دکامتر در ۱۰۰ لیتر آب (با محلول‌پاشی برگ)
- * در درختان میوه و محصولات زراعی: ۱ تا ۲ لیتر در دکامتر (با آبیاری قطره‌ای)
- * در درختان میوه و محصولات زراعی: ۱ تا ۲ لیتر در دکامتر (با آبیاری غرقابی)
- * در درختان میوه و محصولات زراعی: ۲۰۰ تا ۵۰۰ سی‌سی در دکامتر در ۱۰۰ لیتر آب (با محلول‌پاشی برگ)

(توصیه می‌شود کوددهی پس از آنالیز خاک و/یا برگ انجام شود. مقادیر مصرف ذکر شده در اینجا میانگین مقادیر به‌دست‌آمده از آزمایش‌های انجام‌شده توسط شرکت ما است. این مقادیر بسته به بافت خاک‌ها ممکن است متغیر باشد. برای دریافت بهترین برنامه مصرف، با فروشنده نزدیک خود یا شرکت ما تماس بگیرید.)

CALTRATE

کالتريت

محتويات تضمين شده % (وزنی-وزنی)

اکسید کلسیم محلول در آب (۱۲): CaO)

بور محلول در آب (۰.۲): B)

مقادير مصرف:

- * در سبزیجات: ۱ تا ۲ لیتر در دکامتر (با آبیاری قطره‌ای)
- * در سبزیجات: ۲۰۰ تا ۴۰۰ سی‌سی در دکامتر در ۱۰۰ لیتر آب (با محلول‌پاشی برگ‌ی)
- * در درختان میوه و محصولات زراعی: ۱ تا ۲ لیتر در دکامتر (با آبیاری قطره‌ای)
- * در درختان میوه و محصولات زراعی: ۱ تا ۲ لیتر در دکامتر (با آبیاری غرقابی)
- * در درختان میوه و محصولات زراعی: ۲۰۰ تا ۵۰۰ سی‌سی در دکامتر در ۱۰۰ لیتر آب (با محلول‌پاشی برگ‌ی)

(توصیه می‌شود کوددهی پس از آنالیز خاک و/یا برگ انجام شود. مقادیر مصرف ذکر شده در اینجا میانگین مقادیر به‌دست‌آمده از آزمایش‌های انجام‌شده توسط شرکت ما است. این مقادیر بسته به بافت خاک‌ها ممکن است متغیر باشد. برای دریافت بهترین برنامه مصرف، با فروشنده نزدیک خود یا شرکت ما تماس بگیرید.)

محتویات تضمین شده % (وزنی-وزنی)

ماده آلی: ۲۰

کل نیتروژن: ۷

نیتروژن آلی: ۱

نیتروژن نیتراته: ۶

اکسید کلسیم محلول در آب (۱۰): CaO)

بور محلول در آب (۰.۳): B)

اسیدهای آمینه آزاد: ۵

مقادیر مصرف:

- * در سبزیجات: ۱ تا ۲ لیتر در دکامتر (با آبیاری قطره‌ای)
- * در سبزیجات: ۲۰۰ تا ۴۰۰ سی‌سی در دکامتر در ۱۰۰ لیتر آب (با محلول‌پاشی برگ)
- * در درختان میوه و محصولات زراعی: ۱ تا ۲ لیتر در دکامتر (با آبیاری قطره‌ای)
- * در درختان میوه و محصولات زراعی: ۱ تا ۲ لیتر در دکامتر (با آبیاری غرقابی)
- * در درختان میوه و محصولات زراعی: ۲۰۰ تا ۵۰۰ سی‌سی در دکامتر در ۱۰۰ لیتر آب (با محلول‌پاشی برگ)

(توصیه می‌شود کوددهی پس از آنالیز خاک و/یا برگ انجام شود. مقادیر مصرف ذکر شده در اینجا میانگین مقادیر به‌دست‌آمده از آزمایش‌های انجام‌شده توسط شرکت ما است. این مقادیر بسته به بافت خاک‌ها ممکن است متغیر باشد. برای دریافت بهترین برنامه مصرف، با فروشنده نزدیک خود یا شرکت ما تماس بگیرید.)

GLUCOP

گلوکاپ

محتویات تضمین شده % (وزنی-وزنی)

مس محلول در آب (۶): Cu

مقادیر مصرف:

- * در سبزیجات: ۱ تا ۲ لیتر در دکامتر (با آبیاری قطره‌ای)
- * در سبزیجات: ۲۰۰ تا ۴۰۰ سی‌سی در دکامتر در ۱۰۰ لیتر آب (با محلول‌پاشی برگ‌ی)
- * در درختان میوه و محصولات زراعی: ۱ تا ۲ لیتر در دکامتر (با آبیاری قطره‌ای)
- * در درختان میوه و محصولات زراعی: ۱ تا ۲ لیتر در دکامتر (با آبیاری غرقابی)
- * در درختان میوه و محصولات زراعی: ۲۰۰ تا ۵۰۰ سی‌سی در دکامتر در ۱۰۰ لیتر آب (با محلول‌پاشی برگ‌ی)

(توصیه می‌شود کوددهی پس از آنالیز خاک و/یا برگ انجام شود. مقادیر مصرف ذکر شده در اینجا میانگین مقادیر به‌دست‌آمده از آزمایش‌های انجام‌شده توسط شرکت ما است. این مقادیر بسته به بافت خاک‌ها ممکن است متغیر باشد. برای دریافت بهترین برنامه مصرف، با فروشنده نزدیک خود یا شرکت ما تماس بگیرید.)

مقادیر مصرف:

- * در سبزیجات: ۱ تا ۲ لیتر در دکامتر (با آبیاری قطره‌ای)
- * در سبزیجات: ۲۰۰ تا ۴۰۰ سی‌سی در دکامتر در ۱۰۰ لیتر آب (با محلول‌پاشی برگ)
- * در درختان میوه و محصولات زراعی: ۱ تا ۲ لیتر در دکامتر (با آبیاری قطره‌ای)
- * در درختان میوه و محصولات زراعی: ۱ تا ۲ لیتر در دکامتر (با آبیاری غرقابی)
- * در درختان میوه و محصولات زراعی: ۲۰۰ تا ۵۰۰ سی‌سی در دکامتر در ۱۰۰ لیتر آب (با محلول‌پاشی برگ)

(توصیه می‌شود کوددهی پس از آنالیز خاک و/یا برگ انجام شود. مقادیر مصرف ذکر شده در اینجا میانگین مقادیر به‌دست‌آمده از آزمایش‌های انجام‌شده توسط شرکت ما است. این مقادیر بسته به بافت خاک‌ها ممکن است متغیر باشد. برای دریافت بهترین برنامه مصرف، با فروشنده نزدیک خود یا شرکت ما تماس بگیرید.)

REFRESH

ریفرش

محتویات:

اسید هیدروکسی کربوکسیلیک: ۴۵٪

اسید سولفوریک: ۲۰٪

سایر اسیدها و مواد کمکی: ۳۵٪

مقادیر مصرف:

- * در سبزیجات: ۱ تا ۲ لیتر در دکامتر (با آبیاری قطره‌ای)
- * در سبزیجات: ۲۰۰ تا ۴۰۰ سی‌سی در دکامتر در ۱۰۰ لیتر آب (با محلول‌پاشی برگ‌ی)
- * در درختان میوه و محصولات زراعی: ۱ تا ۲ لیتر در دکامتر (با آبیاری قطره‌ای)
- * در درختان میوه و محصولات زراعی: ۱ تا ۲ لیتر در دکامتر (با آبیاری غرقابی)
- * در درختان میوه و محصولات زراعی: ۲۰۰ تا ۵۰۰ سی‌سی در دکامتر در ۱۰۰ لیتر آب (با محلول‌پاشی برگ‌ی)

(توصیه می‌شود کوددهی پس از آنالیز خاک و/یا برگ انجام شود. مقادیر مصرف ذکر شده در اینجا میانگین مقادیر به‌دست‌آمده از آزمایش‌های انجام‌شده توسط شرکت ما است. این مقادیر بسته به بافت خاک‌ها ممکن است متغیر باشد. برای دریافت بهترین برنامه مصرف، با فروشنده نزدیک خود یا شرکت ما تماس بگیرید.)

CARBOXY AGENT

کربکسی ایجنت

عامل اختلاط و امولسیون‌ساز
مرطوب‌کننده و گسترش‌دهنده روی سطح برگ
شاخص pH و اسیدکننده خاک یا محلول
عامل بافتری و اصلاح‌کننده کیفیت آب آبیاری
پاک‌کننده مخزن و تجهیزات سمپاشی

مقادیر مصرف:

- * در سبزیجات: ۱ تا ۲ لیتر در دکامتر (با آبیاری قطره‌ای)
- * در سبزیجات: ۲۰۰ تا ۴۰۰ سی‌سی در دکامتر در ۱۰۰ لیتر آب (با محلول‌پاشی برگ)
- * در درختان میوه و محصولات زراعی: ۱ تا ۲ لیتر در دکامتر (با آبیاری قطره‌ای)
- * در درختان میوه و محصولات زراعی: ۱ تا ۲ لیتر در دکامتر (با آبیاری غرقابی)
- * در درختان میوه و محصولات زراعی: ۲۰۰ تا ۵۰۰ سی‌سی در دکامتر در ۱۰۰ لیتر آب (با محلول‌پاشی برگ)

(توصیه می‌شود کوددهی پس از آنالیز خاک و/یا برگ انجام شود. مقادیر مصرف ذکر شده در اینجا میانگین مقادیر به‌دست‌آمده از آزمایش‌های انجام‌شده توسط شرکت ما است. این مقادیر بسته به بافت خاک‌ها ممکن است متغیر باشد. برای دریافت بهترین برنامه مصرف، با فروشنده نزدیک خود یا شرکت ما تماس بگیرید.)

MOTTO K

موتو پتاسیوم (K)

محتویات تضمین شده % (وزنی-وزنی)

کل نیتروژن: ۳

پتاسیم محلول در آب (۲۵): K_2O

pH: ۶.۱

مقادیر مصرف:

- * در سبزیجات: ۱ تا ۲ لیتر در دکامتر (با آبیاری قطره‌ای)
- * در سبزیجات: ۲۰۰ تا ۴۰۰ سی‌سی در دکامتر در ۱۰۰ لیتر آب (با محلول‌پاشی برگ‌ی)
- * در درختان میوه و محصولات زراعی: ۱ تا ۲ لیتر در دکامتر (با آبیاری قطره‌ای)
- * در درختان میوه و محصولات زراعی: ۱ تا ۲ لیتر در دکامتر (با آبیاری غرقابی)
- * در درختان میوه و محصولات زراعی: ۲۰۰ تا ۵۰۰ سی‌سی در دکامتر در ۱۰۰ لیتر آب (با محلول‌پاشی برگ‌ی)

(توصیه می‌شود کوددهی پس از آنالیز خاک و/یا برگ انجام شود. مقادیر مصرف ذکر شده در اینجا میانگین مقادیر به‌دست‌آمده از آزمایش‌های انجام‌شده توسط شرکت ما است. این مقادیر بسته به بافت خاک‌ها ممکن است متغیر باشد. برای دریافت بهترین برنامه مصرف، با فروشنده نزدیک خود یا شرکت ما تماس بگیرید.)

موتو بلنس ۷-۷-۷

محتویات تضمین شده % (وزنی-وزنی)

کل نیتروژن (۷): N)

نیتروژن آمونیومی (۲): N)

نیتروژن اورهای (۵): N)

پنتا اکسید فسفر محلول در آب (۷): P_2O_5)

پتاسیم محلول در آب (۷): K_2O)

مقادیر مصرف:

- * در سبزیجات: ۱ تا ۲ لیتر در دکامتر (با آبیاری قطره‌ای)
- * در سبزیجات: ۲۰۰ تا ۴۰۰ سی‌سی در دکامتر در ۱۰۰ لیتر آب (با محلول‌پاشی برگ‌ی)
- * در درختان میوه و محصولات زراعی: ۱ تا ۲ لیتر در دکامتر (با آبیاری قطره‌ای)
- * در درختان میوه و محصولات زراعی: ۱ تا ۲ لیتر در دکامتر (با آبیاری غرقابی)
- * در درختان میوه و محصولات زراعی: ۲۰۰ تا ۵۰۰ سی‌سی در دکامتر در ۱۰۰ لیتر آب (با محلول‌پاشی برگ‌ی)

(توصیه می‌شود کوددهی پس از آنالیز خاک و/یا برگ انجام شود. مقادیر مصرف ذکر شده در اینجا میانگین مقادیر به‌دست‌آمده از آزمایش‌های انجام‌شده توسط شرکت ما است. این مقادیر بسته به بافت خاک‌ها ممکن است متغیر باشد. برای دریافت بهترین برنامه مصرف، با فروشنده نزدیک خود یا شرکت ما تماس بگیرید.)

MOTTO PZn

موتو PZn

محتویات تضمین شده % (وزنی-وزنی)

کل نیتروژن: ۳

نیتروژن آمونیومی: ۱.۲

نیتروژن کاربامیدی: ۱.۸

پنتا اکسید فسفر محلول در آب (۱۵): P_2O_5

روی محلول در آب (۳): Zn

مقادیر مصرف:

- * در سبزیجات: ۱ تا ۲ لیتر در دکامتر (با آبیاری قطره‌ای)
- * در سبزیجات: ۲۰۰ تا ۴۰۰ سی‌سی در دکامتر در ۱۰۰ لیتر آب (با محلول‌پاشی برگ‌گی)
- * در درختان میوه و محصولات زراعی: ۱ تا ۲ لیتر در دکامتر (با آبیاری قطره‌ای)
- * در درختان میوه و محصولات زراعی: ۱ تا ۲ لیتر در دکامتر (با آبیاری غرقابی)
- * در درختان میوه و محصولات زراعی: ۲۰۰ تا ۵۰۰ سی‌سی در دکامتر در ۱۰۰ لیتر آب (با محلول‌پاشی برگ‌گی)

(توصیه می‌شود کوددهی پس از آنالیز خاک و/یا برگ انجام شود. مقادیر مصرف ذکر شده در اینجا میانگین مقادیر به‌دست‌آمده از آزمایش‌های انجام‌شده توسط شرکت ما است. این مقادیر بسته به بافت خاک‌ها ممکن است متغیر باشد. برای دریافت بهترین برنامه مصرف، با فروشنده نزدیک خود یا شرکت ما تماس بگیرید.)

MOTTO ZnB

موتو روی-بور (ZnB)

محتویات تضمین شده % (وزنی-وزنی)

روی محلول در آب (۱۰): Zn)

بور محلول در آب (۱۰): B)

مقادیر مصرف:

- * در سبزیجات: ۱ تا ۲ لیتر در دکامتر (با آبیاری قطره‌ای)
- * در سبزیجات: ۲۰۰ تا ۴۰۰ سی‌سی در دکامتر در ۱۰۰ لیتر آب (با محلول‌پاشی برگ‌ی)
- * در درختان میوه و محصولات زراعی: ۱ تا ۲ لیتر در دکامتر (با آبیاری قطره‌ای)
- * در درختان میوه و محصولات زراعی: ۱ تا ۲ لیتر در دکامتر (با آبیاری غرقابی)
- * در درختان میوه و محصولات زراعی: ۲۰۰ تا ۵۰۰ سی‌سی در دکامتر در ۱۰۰ لیتر آب (با محلول‌پاشی برگ‌ی)

(توصیه می‌شود کوددهی پس از آنالیز خاک و/یا برگ انجام شود. مقادیر مصرف ذکر شده در اینجا میانگین مقادیر به‌دست‌آمده از آزمایش‌های انجام‌شده توسط شرکت ما است. این مقادیر بسته به بافت خاک‌ها ممکن است متغیر باشد. برای دریافت بهترین برنامه مصرف، با فروشنده نزدیک خود یا شرکت ما تماس بگیرید.)

MIX TOTAL

میکس توتال

محتویات تضمین شده % (وزنی-وزنی)

بور محلول در آب (۱): B)

مس محلول در آب (۰.۶): Cu)

آهن محلول در آب (۵): Fe)

منگنز محلول در آب (۴): Mn)

روی محلول در آب (۵): Zn)

مقادیر مصرف:

- * در سبزیجات: ۱ تا ۲ لیتر در دکامتر (با آبیاری قطره‌ای)
- * در سبزیجات: ۲۰۰ تا ۴۰۰ سی‌سی در دکامتر در ۱۰۰ لیتر آب (با محلول‌پاشی برگ)
- * در درختان میوه و محصولات زراعی: ۱ تا ۲ لیتر در دکامتر (با آبیاری قطره‌ای)
- * در درختان میوه و محصولات زراعی: ۱ تا ۲ لیتر در دکامتر (با آبیاری غرقابی)
- * در درختان میوه و محصولات زراعی: ۲۰۰ تا ۵۰۰ سی‌سی در دکامتر در ۱۰۰ لیتر آب (با محلول‌پاشی برگ)

(توصیه می‌شود کوددهی پس از آنالیز خاک و/یا برگ انجام شود. مقادیر مصرف ذکر شده در اینجا میانگین مقادیر به‌دست‌آمده از آزمایش‌های انجام‌شده توسط شرکت ما است. این مقادیر بسته به بافت خاک‌ها ممکن است متغیر باشد. برای دریافت بهترین برنامه مصرف، با فروشنده نزدیک خود یا شرکت ما تماس بگیرید.)

منوفر

محتویات تضمین شده % (وزنی-وزنی)

آهن محلول در آب (۱۷): Fe)

منگنز محلول در آب (۶): Mn)

مقادیر مصرف:

- * در سبزیجات: ۱ تا ۲ لیتر در دکامتر (با آبیاری قطره‌ای)
- * در سبزیجات: ۲۰۰ تا ۴۰۰ سی‌سی در دکامتر در ۱۰۰ لیتر آب (با محلول‌پاشی برگ)
- * در درختان میوه و محصولات زراعی: ۱ تا ۲ لیتر در دکامتر (با آبیاری قطره‌ای)
- * در درختان میوه و محصولات زراعی: ۱ تا ۲ لیتر در دکامتر (با آبیاری غرقابی)
- * در درختان میوه و محصولات زراعی: ۲۰۰ تا ۵۰۰ سی‌سی در دکامتر در ۱۰۰ لیتر آب (با محلول‌پاشی برگ)

(توصیه می‌شود کوددهی پس از آنالیز خاک و/یا برگ انجام شود. مقادیر مصرف ذکر شده در اینجا میانگین مقادیر به‌دست‌آمده از آزمایش‌های انجام‌شده توسط شرکت ما است. این مقادیر بسته به بافت خاک‌ها ممکن است متغیر باشد. برای دریافت بهترین برنامه مصرف، با فروشنده نزدیک خود یا شرکت ما تماس بگیرید.)